

HỘI ĐỒNG THUỐC & ĐIỀU TRỊ
TIỂU BAN GIÁM SÁT
THÔNG TIN THUỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Thông tin truyền thông
PARACETAMOL ↔ ACETYLCYSTEIN
CÓ THỂ SỬ DỤNG CHUNG



Ngày 18 tháng 12 năm 2023

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thành Phương




PARACETAMOL - ACETYLCYSTEIN

CÓ THỂ SỬ DỤNG CHUNG

Cơ chế tác động

- **Paracetamol:** tác động lên trung tâm điều hòa thân nhiệt ở vùng dưới đồi
- **Acetylcystein:** cắt đứt liên kết disulfid của chất nhầy, làm tiêu nhầy

Cơ chế giải độc Paracetamol của Acetylcystein



NAPQI: N-acetyl-p-benzoquinone imine
CYP450: Cytochrome P450

KẾT LUẬN

- Paracetamol và Acetylcystein **không có tương tác** ảnh hưởng đến tác dụng điều trị của 2 thuốc → 2 thuốc có thể sử dụng chung.
- Khi ngộ độc Paracetamol, dùng Acetylcystein liều cao để giải độc.