

HỘI ĐỒNG THUỐC & ĐIỀU TRỊ
TIÊU BAN GIÁM SÁT
THÔNG TIN THUỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Thông tin truyền thông
THUỐC ACID TRANEXAMIC



Ngày 7 tháng 12 năm 2023

TRƯỞNG BAN

TS.BS Nguyễn Thành Phương

ACID TRANEXAMIC



CHỈ ĐỊNH

***Xuất huyết bất thường do tăng sự tiêu sợi fibrin tại chỗ**

- Chảy máu phổi⁽²⁾⁽³⁾
- Chảy máu âm đạo⁽³⁾
- Chảy máu thận⁽²⁾⁽³⁾
- Chảy máu mũi⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
- Chảy máu bất thường trong hoặc sau phẫu thuật (cắt bỏ tuyến tiền liệt, cắt bỏ phần cổ tử cung, nhổ răng ở người ưa chảy máu)⁽²⁾
- Rong kinh⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

***Xuất huyết do tăng sự tiêu sợi fibrin toàn thân**

- Bệnh bạch cầu⁽²⁾
- Thiếu máu bất sản⁽³⁾
- Ban xuất huyết⁽²⁾
- Biến chứng chảy máu do liệu pháp tiêu huyết khối⁽¹⁾⁽²⁾

LIỀU DÙNG

Acid tranexamic dùng đường uống, tiêm tĩnh mạch chậm (tối đa 100 mg/phút hay tốc độ không quá 1 ml/phút) hoặc truyền tĩnh mạch liên tục. Dùng đường tĩnh mạch sau vài ngày thường chuyển sang đường uống. Cũng có thể điều trị khởi đầu bằng tiêm tĩnh mạch, sau đó truyền tĩnh mạch liên tục.

Dạng viên:

Liều uống hàng ngày cho người lớn là mỗi lần uống 250-500 mg (1-2 viên), 3-4 lần/ngày.

Dạng tiêm:

Liều thông thường cho người lớn là 250 đến 500 mg/ngày (1-2 ống) tiêm mạch hoặc tiêm bắp chia làm 1 đến 2 lần/ngày.

Trong hay sau thời gian phẫu thuật, nếu cần có thể dùng 500-1000 mg ngay lúc đó bằng đường tĩnh mạch hoặc 500-2500 mg bằng cách truyền tĩnh mạch nhỏ giọt.

→ Hạn chế dùng cho trẻ em do chưa có dữ liệu về sự an toàn của thuốc.

*Liều có thể được điều chỉnh theo tuổi tác và các dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với acid tranexamic⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
- Tiền sử bệnh huyết khối tắc mạch hoặc có nguy cơ huyết khối⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
- Chảy máu dưới màng nhện, rối loạn thị giác kiểu loạn màu sắc mắc phải⁽¹⁾⁽²⁾
- Suy thận nặng⁽¹⁾⁽²⁾
- Tiền sử động kinh⁽²⁾

TƯƠNG TÁC - TƯƠNG Kỵ

- Không nên dùng đồng thời acid tranexamic với estrogen vì có thể gây huyết khối nhiều hơn⁽¹⁾⁽²⁾
- Dung dịch acid tranexamic tương kỵ với dung dịch có chứa penicilin⁽²⁾