



THÔNG TIN THUỐC

BẢN TIN SỐ 01/2024

Ngày 25 tháng 03 năm 2024
TRƯỞNG BAN
(đã ký)



HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ TIỂU BAN GIÁM SÁT THÔNG TIN THUỐC


HƯỚNG DẪN CÁCH PHA THUỐC (CEFDINIR 250mg/6ml)

Các bước pha 1 lọ thuốc (Cefdinir):



1. Lắc nhẹ chai để bột rơi ra, mở nắp.
2. Thêm **vừa đủ 60ml nước đun sôi để nguội đến vạch đã đánh dấu trên chai.**
3. Đóng nắp lại, đảo ngược chai và lắc mạnh chai trong ít nhất 5 giây để thu được hỗn dịch đồng nhất của 250mg cefdinir/6ml.
4. Lắc kỹ hỗn dịch trước khi chia mỗi liều.
5. Sau khi pha nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Hỗn dịch này chỉ được dùng trong 7 ngày sau khi pha.

Hướng dẫn xử trí trẻ nôn trong hoặc sau khi uống thuốc:



Tài liệu tham khảo:

1. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
2. <https://www.healthhub.sg/a-z/medications/administration-mixing-powdered-medication-into-suspensions>
3. Kendrick, J. G., Ma, K., Dezorzi, P., & Hamilton, D. (2012). Vomiting of oral medications by pediatric patients: survey of medication redosing practices. The Canadian journal of hospital pharmacy, 65(3), 196-201 <https://doi.org/10.4212/cjhp.v65i3.1142>
4. Xử trí trẻ nôn sau khi uống thuốc, <https://nhidong.org.vn/chuyen-muc/xu-tri-tre-non-sau-khi-uong-thuoc-c3-1991.aspx>

