

THÔNG TIN THUỐC

Ngày 15 tháng 7 năm 2025
TRƯỞNG BAN

lh


Lê Hằng



PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ H.PYLORI HIỆN HÀNH



Phác đồ	Thời gian (ngày)	Thành phần phác đồ
PTMB	14	PPI + Tetracyclin + Metronidazol + Bismuth
PALB	14	PPI + Amoxicilin + Levofloxacin + Bismuth



Thuốc	Kháng sinh	PPI
Loại và số lần dùng	A 1000mg x 2 lần/ngày B: • Bismuth subcitrat (120-300mg) x 4 lần/ngày • Bismuth subsalicylat (262-525mg) x 4 lần/ngày C 500mg x 2 lần/ngày L 500mg x 1 lần/ngày M 500mg x 2- 3 lần/ngày* Te 500mg x 4 lần/ngày Ti 500mg x 2 lần/ngày	Esomeprazole 40mg x 2 lần/ngày Lanzoprazole 30mg x 2 lần/ngày Omeprazole 40mg x 2 lần/ngày Pantoprazole 40mg x 2 lần/ngày Rabeprazole 20mg x 2 lần/ngày
Thời điểm sử dụng	Dùng ngay sau bữa ăn. Nếu dùng 4 lần thì thêm 1 lần trước ngủ đêm	Trước bữa ăn sáng và bữa ăn chiều 30 phút

Ghi chú: A: Amoxicilline, C: Clarithromycin, Te: Tetracycline, Ti: Tinidazole, M: Metronidazole,

B: Bismuth subcitrate/Bismuth subsalicylat, L: Levofloxacin

* Metronidazole dùng 3 lần/ngày đối với phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth và dùng 2 lần/ngày khi phối hợp trong các phác đồ khác.

- Hội khoa học Tiêu Hóa Việt Nam (2022), Đồng thuận chẩn đoán và điều trị nhiễm Helicobacter Pylori
- Bộ Y tế (2022). Dược thư Quốc gia Việt Nam

Vui lòng truy cập website bệnh viện để theo dõi bản tin Thông tin thuốc: <https://bvdkkvcuchi.vn/thong-tin-thuoc/>