




THÔNG TIN THUỐC

**THÔNG TIN THUỐC MỚI:
CIPROFLOXACIN IMP 200MG/ 20ML (DẠNG ĐẬM
ĐẶC) - HƯỚNG DẪN PHA TIÊM VÀ SỬ DỤNG**

Ngày 10 tháng 11 năm 2025
TRƯỞNG BAN

lh
Lê Hoàng



HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
TIỂU BAN GIÁM SÁT THÔNG TIN THUỐC



THÔNG TIN THUỐC MỚI: CIPROFLOXACIN IMP 200MG/ 20ML (DẠNG ĐẬM ĐẶC) - HƯỚNG DẪN PHA TIÊM VÀ SỬ DỤNG

(Tài liệu dành cho nhân viên y tế)

Dung dịch Ciprofloxacin đậm đặc **PHẢI PHA LOÃNG** TRƯỚC KHI TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH

LÍ DO PHA LOÃNG

Dung dịch Ciprofloxacin đậm đặc có chứa **acid lactic** và **pH acid khoảng 3,3-3,9**. Cần **PHẢI PHA LOÃNG** để tránh phản ứng tại vị trí tiêm truyền (viêm tĩnh mạch, viêm tĩnh mạch huyết khối)

DẠNG BẢO CHẾ

Dung dịch **đậm đặc pha tiêm truyền** đóng trong **lọ thủy tinh**

THỜI GIAN TRUYỀN


Trên **60 phút**

BẢO QUẢN

Sử dụng ngay
Thuốc chỉ **dùng một lần**

CÁCH PHA TRUYỀN TĨNH MẠCH

PHA LOÃNG



KHUYẾN CÁO

Truyền thuốc chậm vào tĩnh mạch lớn:
- **Giảm** thiểu sự khó chịu cho bệnh nhân
- **Giảm** nguy cơ kích ứng tĩnh mạch

TLTK:

1. Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc Ciprofloxacin IMP 200mg/ 20mL

3. Hosseini S, Mohammadi A, Fattahi A, Hashemi S, Khajeamin Y. IV Ciprofloxacin-Induced Phlebitis: Investigating the Impact of Pharmaceutical and Process-Related Factors on Patient Safety. J Pharm Care. 2024;12(3) 195-197.

Vui lòng truy cập website bệnh viện để theo dõi bản tin Thông tin thuốc hoặc quét mã QR: <https://bvdckvcuchi.vn/thong-tin-thuoc/>