

THÔNG TIN THUỐC

HƯỚNG DẪN PHA TIÊM NHÓM THUỐC PPI



Ngày 29 tháng 5 năm 2026
TRƯỞNG BAN
(đã ký)



HƯỚNG DẪN PHẠ TIÊM NHÓM THUỐC PPI

(Tài liệu dành cho nhân viên y tế)

LƯU Ý

Theo hướng dẫn, dung môi sử dụng để pha **TIÊM TĨNH MẠCH** các thuốc nhóm PPI là **NaCl 0,9%**.

Tên thương mại: Panvinjec, Pantoloc i.v
Hoạt chất: Pantoprazol

Tiêm tĩnh mạch trực tiếp



Bột pha tiêm **40 mg** + **NaCl 0,9%** 10ml

Bảo quản:

Trong vòng **12 giờ** ở **25 °C**

Truyền tĩnh mạch



Bột pha tiêm **40 mg** / **80 mg** + **NaCl 0,9%; Glu 5%**

Trong xử trí xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày - tá tràng: **80mg tiêm tĩnh mạch chậm**, sau đó đảm bảo tốc độ 8mg/giờ truyền tĩnh mạch **liên tục 72 giờ**.

Tên thương mại: Nexium, Esovex-40
Hoạt chất: Esomeprazol

Tiêm tĩnh mạch trực tiếp




Bột pha tiêm **40 mg** + **NaCl 0,9%** 5ml

Bảo quản:

Trong vòng **12 giờ** ở **30 °C**

Truyền tĩnh mạch



Bột pha tiêm **40 mg** / **80 mg** + **NaCl 0,9%**

Trong xử trí xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày - tá tràng: 80mg **tiêm tĩnh mạch chậm**, sau đó đảm bảo tốc độ 8mg/giờ truyền tĩnh mạch **liên tục 72 giờ**.