

THÔNG TIN THUỐC

MỘT SỐ LƯU Ý KHI TIÊM TRUYỀN CEFTRIAXON



Ngày 10 tháng 3 năm 2026
TRƯỞNG BAN
(đã ký)




MỘT SỐ LƯU Ý KHI TIÊM TRUYỀN CEFTRIAXON

Ceftriaxon là kháng sinh cephalosporin thế hệ 3, được sử dụng phổ biến trên lâm sàng do phổ kháng khuẩn rộng, hiệu lực mạnh và thời gian bán thải dài giúp giảm số lần sử dụng trong ngày.



TƯƠNG TÁC THUỐC

 Một số trường hợp ghi nhận **kết tủa** hình thành ở phổi và thận ở trẻ sơ sinh khi sử dụng đồng thời ceftriaxon và dung dịch có chứa calci.

→ **Chống chỉ định** sử dụng ceftriaxon cho **trẻ sơ sinh** (dưới 28 ngày tuổi) cần điều trị bằng calci đường tĩnh mạch hoặc dịch truyền có chứa calci (như Ringer Lactat), đặc biệt ở trẻ sinh non.

- Các đối tượng khác: **không trộn lẫn** ceftriaxon và dung dịch chứa calci trong cùng 1 đường truyền, dùng 2 thuốc theo **2 đường truyền** tại 2 vị trí khác nhau hoặc dùng lần lượt từng thuốc sau khi tráng rửa đường truyền bằng dung môi tương hợp.



ADR



Sử dụng liều 2g **tiêm tĩnh mạch nhanh** từ 1-5 phút có thể gây ra các triệu chứng như đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, bồn chồn, vã mồ hôi, giãn đồng tử sau khi tiêm.

Theo báo cáo của Trung tâm DI & ADR Quốc gia từ năm 2022-2024, **ceftriaxon** là thuốc nghi ngờ có số lượng báo cáo nhiều nhất. Phản ứng quá mẫn xảy ra ở nhiều mức độ từ nhẹ (mày đay, ngứa, phù mi mắt, ...) đến nghiêm trọng hơn (sốc phản vệ, tụt huyết áp, tím tái, ...), có thể dẫn đến tử vong.



CÁCH DÙNG

- Liều 1g: có thể dùng một trong các đường dùng sau: tiêm bắp sâu, tiêm tĩnh mạch chậm 5 phút hoặc truyền tĩnh mạch ít nhất 30 phút.
- **Liều 2g**: dùng 1 lần/ngày, **truyền tĩnh mạch** trong ít nhất 30 phút.
- Liều 4g/ngày (liều tối đa): có thể chia 2 lần/ngày, truyền tĩnh mạch 2g/lần trong ít nhất 30 phút.
- Trẻ em dưới 12 tuổi: với liều $\geq 50\text{mg/kg}$ ưu tiên sử dụng đường truyền tĩnh mạch ít nhất 30 phút.
- Trẻ sơ sinh: truyền tĩnh mạch ít nhất 60 phút để giảm nguy cơ bệnh não do bilirubin.

1. Bộ Y tế. Dược thư Quốc gia Việt Nam. Nhà xuất bản Y học. 2022.

2. Bộ Y tế. Quyết định 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 về việc ban hành Danh mục Tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Trung tâm DI & ADR Quốc gia. Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2025.

4. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc ceftriaxon

5. Micromedex. Chuyên luận Ceftriaxon. 2026.