

THÔNG TIN THUỐC

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CEFIXIM



Ngày 21 tháng 07 năm 2026
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)



MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CEFIXIM

(Tài liệu dành cho nhân viên y tế)

1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên hoạt chất:** Cefixim
- Nhóm thuốc:** Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3
- Cơ chế tác dụng:**

Ức chế tổng hợp thành tế bào VK thông qua gắn vào protein đích (protein gắn penicilin - PBP), có tác dụng diệt khuẩn.

2. PHỔ TÁC DỤNG

✓ **CÓ HOẠT TÍNH TRÊN**

Gram dương

- Streptococcus pyogenes*
- Streptococcus agalactiae*

Gram âm

- Haemophilus influenzae*
- Moraxella catarrhalis*
- Escherichia coli*
- Proteus mirabilis*
- Klebsiella pneumoniae*
- Salmonella spp.*
- Shigella spp.*
- Neisseria gonorrhoeae*

✗ **KHÔNG CÓ HOẶC RẤT KÉM HOẠT TÍNH**

- Staphylococcus aureus* (MSSA & MRSA)
- Enterococcus spp.*
- Pseudomonas aeruginosa*
- Acinetobacter spp.*
- Bacteroides fragilis*
- Listeria monocytogenes*
- Enterobacter spp.*



3. CHỈ ĐỊNH

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên**

Viêm tai giữa

Viêm họng/viêm amidan do liên cầu

Viêm mũi xoang cấp do vi khuẩn

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới**

Viêm phế quản cấp và mạn

- Nhiễm khuẩn tiết niệu không biến chứng**

- Bệnh lậu không biến chứng** (phối hợp azithromycin):

lựa chọn thay thế khi phác đồ ưu tiên không phù hợp hoặc không sẵn có



KHÔNG PHẢI LÀ LỰA CHỌN ĐẦU TAY
Nhiễm trùng da mô mềm

4. LIỀU DÙNG

Người lớn

200 mg
x 2 lần/ngày

HOẶC

400 mg
x 1 lần/ngày

Thời gian điều trị


Bệnh	Thời gian
Viêm tai giữa	10-14 ngày
Viêm họng/ viêm amidan	5-10 ngày
NK đường hô hấp dưới	10-14 ngày
NK tiết niệu không biến chứng	5-10 ngày

Trẻ em

- 8 mg/kg/ngày (uống 1 lần hoặc chia 2 lần/ngày)
- Tối đa 400 mg/ngày

5. HIỆU CHỈNH LIỀU THEO CHỨC NĂNG THẬN

CrCl (ml/phút)	Liều khuyến cáo
> 60	Không hiệu chỉnh
21 - 59	300 mg/ngày
<20	200 mg/ngày



BN chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng có thể dùng liều giống như liều BN có CrCl < 20 ml/phút

6. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI KÊ ĐƠN

KHÔNG KHUYẾN CÁO DÙNG CEFIXIM TRONG:

- ✗ Điều trị viêm mô bào hoặc nhiễm trùng da mô mềm do MSSA
- ✗ Nghi ngờ nhiễm MRSA
- ✗ Cần bao phủ *Pseudomonas aeruginosa*

LƯU Ý:

Không có hoạt tính in vitro đối với tụ cầu tiết hoặc không tiết penicillinase bao gồm *Staphylococcus aureus* và *Staphylococcus* kháng methicillin.

TLTK:

- Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022
- UpToDate. Cefixime. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham (MA): UpToDate Inc. Truy cập ngày 08 tháng 7 năm 2026.
- CLSI M100™ 36th Edition Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing 2026
- Sanford guide: antibacterial agent: spectra of activity