

THÔNG TIN THUỐC

TƯƠNG TÁC THUỐC VỚI COLCHICIN THEO QUYẾT ĐỊNH 5948/QĐ-BYT



Ngày 13 tháng 10 năm 2026
TRƯỞNG BAN

(đã ký)



TƯƠNG TÁC THUỐC VỚI COLCHICIN THEO QUYẾT ĐỊNH 5948/QĐ-BYT

(Tài liệu dành cho nhân viên y tế)

CƠ CHẾ XẢY RA TƯƠNG TÁC THUỐC

Colchicin là cơ chất của CYP3A4 và P-glycoprotein (P-gp). CYP3A4 tham gia chuyển hóa colchicin; P-gp là chất vận chuyển tổng xuất, góp phần hạn chế hấp thu và thúc đẩy thải trừ colchicin. Khi dùng cùng thuốc ức chế mạnh CYP3A4 và/hoặc P-gp, chuyển hóa/thải trừ colchicin giảm, làm tăng phơi nhiễm và tăng nguy cơ độc tính nghiêm trọng.

20 CẶP TƯƠNG TÁC CÓ COLCHICIN THEO QUYẾT ĐỊNH 5948 CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2021



Chống chỉ định phối hợp ở người bệnh suy gan hoặc suy thận
Nên tránh phối hợp ở người bệnh có chức năng gan, thận bình thường

ỨC CHẾ MẠNH CYP3A4 (Giảm chuyển hóa colchicin)

- Boceprevir
- Posaconazol
- Voriconazol
- Roxithromycin
- Indinavir +/- ritonavir
- Saquinavir +/- ritonavir

ỨC CHẾ CYP3A4 và P-gp (Giảm chuyển hóa & thải trừ)

- Clarithromycin
- Erythromycin
- Itraconazol
- Atazanavir/ritonavir
- Darunavir/ritonavir
- Lopinavir/ritonavir

ỨC CHẾ P-gp (Giảm thải trừ colchicin)

- Amiodaron
- Carvedilol
- Diltiazem
- Verapamil
- Ranolazin
- Ciclosporin
- Nilotinib
- Sunitinib

HẬU QUẢ/DẤU HIỆU ĐỘC TÍNH

- Tiêu hóa - thường là dấu hiệu sớm : Tiêu chảy, nôn, đau bụng
- Toàn thân/huyết học : Sốt, xuất huyết, giảm cả ba dòng tế bào máu
- Thần kinh - cơ : Đau cơ, mỏi cơ hoặc yếu cơ, nước tiểu sẫm màu, dị cảm
- Trường hợp nặng có thể gây suy đa tạng và tử vong

LƯU Ý

SUY GAN HOẶC SUY THẬN
→ **Chống chỉ định phối hợp**



CHỨC NĂNG GAN, THẬN BÌNH THƯỜNG

- **Nên tránh phối hợp**
- Nếu phối hợp: giảm liều colchicin. Dừng liều tiếp theo của colchicin sau 3 ngày. Theo dõi nguy cơ độc tính của colchicin.



Theo dõi độc tính; nếu có, hãy cân nhắc tạm ngừng hoặc ngừng sử dụng colchicin

Nhãn FDA nhấn mạnh tương tác colchicin với chất ức chế P-gp và/hoặc CYP3A4 có thể đe dọa tính mạng